


核准日期： 2006 年 12 月 15 日
发布或修订日期： 2012 年 10 月 23 日

注射用阿魏酸钠说明书
请仔细阅读说明书并在医师指导下使用
警示语： 对本品过敏者禁用

【药品名称】 【通用名称】 注射用阿魏酸钠
【商品名】
【英文名】 Sodium Ferulate for Injection
【汉语拼音】 Zhusheyong Aweisuanna
【成份】 【化学名称】 3-甲氧基-4-羟基桂皮酸钠盐二水合物。

【化学结构式】



【分子式】 C₁₀H₉NaO₄·2H₂O

【分子量】 252.20

【注射剂辅料】 甘露醇

【性状】 本品为白色或类白色结晶或结晶性粉末（供无菌粉末用）；或白色至淡黄色或淡黄绿色疏松块状物或粉末（供无菌冻干品用）；无臭。

【适应症】 用于缺血性心脑血管病的辅助治疗。

【规格】 0.1g

【用法用量】 静脉滴注：一次 0.1-0.3g，一日一次，溶解后加入葡萄糖注射液、生理盐水或葡萄糖氯化钠注射液 100-500ml 静滴。

肌内注射：一次 0.1g，一日 1-2 次，临用前以生理盐水 2-4ml 溶解。建议一个疗程为 10 天。

【不良反应】 偶有过敏性皮疹反应，停药后即消失。

【禁忌】 对本品过敏者禁用。

【注意事项】 生理盐水溶解时少许沉淀不影响使用，摇匀后即可。
当药品性状发生改变时：如瓶内有异物、颜色改变请勿使用。

【孕妇及哺乳期妇女用药】 孕妇不宜使用，哺乳期妇女慎用。

【儿童用药】 尚不明确。

【老年用药】 尚不明确。

【药物相互作用】 尚不明确。

【药物过量】 尚不明确。

【药理毒理】 动物研究结果显示阿魏酸钠能抑制丙二醛及血栓素 B₂ 的产生，减轻心肌水肿及乳酸脱氢酶的释放，并能促进 6-酮-前列腺 F_{1α} 的产生，具有抗血小板聚集、舒张血管及心肌保护作用。

【药代动力学】 大鼠按 40mg/kg 静脉给予阿魏酸钠后，半衰期(t_{1/2})为 9.86 分钟，体内药代动力学属开放式单室模型。

【贮藏】 遮光，密闭保存。

【包装】 低硼硅玻璃管制注射剂瓶，6 支/盒。

【有效期】 24 个月

【执行标准】 《中国药典》2015 年版二部。

【批准文号】 国药准字 H20059437